

Progetto Life Risorgive LIFE 14 NAT/IT/000938



Tavola

Roggia Girona

Tipo intervento

Manutenzione capofonte e Riqualificazione ambientale
Intervento di tipo "C"

Numero risorgive

CR 11, CR 12, CR 13, CR 14
CR 15

Tav. N.

8

Data

01/06/2016

Aggiornamenti

Progettisti

Dott. For. Artolozzi Silvia
Dott. Biol. Stefano Salviati
Dott. Nat. Giovanni La Piana

Prima variante 31/03/2017

Partners

AQUAPROGRAM

VENETO
AGRICOLTURA

Progetto Life

Rete Natura
2000

Comune di
Bressanvido

Consorzio di
bonifica di
BRENTA



Valutazione di Incidenza



Dott. Artolozzi Silvia



Dott. Giovanni La Piana



Dott. Stefano Salviati

INDICE

INDICE	I
Introduzione	1
FASE 1	3
FASE 2 – Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti	4
2.1 Descrizione del piano, progetto o intervento	4
2.1.1 Inquadramento territoriale	4
2.1.2 Finalità dell'intervento.....	4
2.1.3 Aree direttamente interessate dall'intervento	6
2.1.4 Uso del suolo nelle aree direttamente interessate	8
2.1.5 Caratteristiche dimensionali dell'intervento.....	8
2.1.6 Durata dell'attuazione e cronoprogramma dell'intervento	8
2.1.7 Utilizzo delle risorse (rinnovabili e non rinnovabili).....	9
2.1.8 Fabbisogno nel campo dei trasporti, viabilità e reti infrastrutturali	9
2.1.9 Relazioni con ulteriori piani, progetti o interventi	9
2.2 Identificazione e misura degli effetti dei fattori perturbativi originati dalle azioni dell'intervento	10
2.2.1 Fase di cantiere.....	10
2.2.2 Fase di esercizio	10
2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi	12
2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente... ..	14
FASE 3 - Valutazione della significatività degli effetti	15
3.1 Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati	15
3.1.1 Habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE presenti nel Sito	15
3.1.2 Specie faunistiche e vegetazionali presenti nel Sito	17
3.1.3 Assetto vegetazionale dell'area di analisi	27
3.1.4 Habitat in nell'Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE presenti nell'area di intervento	30
3.1.5 Specie faunistiche e vegetazionali presenti nell'area di intervento	32
3.2 Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione	35
3.3 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono	36
3.3.1 Habitat e specie vulnerabili hai fattori di pressioni.....	36

3.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.....	43
3.4.1 Descrizione del grado di conservazione allo status quo Habitat	46
FASE 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare	48
BIBLIOGRAFIA E FONTI.....	53
ALLEGATI.....	54
Allegato 1: TAVOLA 8 "Roggia Giosa" - Tavola di progetto	54
Allegato 2: TAVOLA 8 " Roggia Giosa " - Piano Particolare.....	54

Introduzione

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze negative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti "non" direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

La valutazione di incidenza si deve applicare sia a progetti che interessano direttamente i siti di Importanza Comunitaria, sia a progetti che anche indirettamente possano avere un qualche effetto su tali siti, essa rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione di incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

Secondo la DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014 – Allegato A "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE", tutti gli studi per la valutazione di incidenza prevedono l'effettuazione della selezione preliminare (screening). Nei casi in cui siano evidenziate incidenze significative negative su habitat o specie dovrà essere sempre effettuata anche la valutazione appropriata, affinché il piano, progetto o intervento possa avere esito favorevole per l'approvazione.

- **Selezione preliminare (screening)** - La selezione preliminare si compone di quattro fasi sequenziali che devono essere sempre svolte.

- 1) La prima fase verifica la necessità di procedere con lo studio in quanto il piano, progetto o intervento non ricade tra quelli soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza.
- 2) La seconda fase descrive il piano, progetto o intervento e ne individua e misura gli effetti.

- 3) La terza fase verifica se gli effetti si traducano in incidenze significative negative sugli habitat e le specie tutelati nei siti della rete Natura 2000.
- 4) La quarta fase riassume le informazioni delle precedenti ed è sottoscritta per autenticità dagli estensori dello studio.

- **Valutazione appropriata** – Esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione in deroga a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

- **Programma di monitoraggio** – nel caso in cui le informazioni non sono sufficienti rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario, il proponente può ricorrere ad un programma di monitoraggio per integrare il proprio studio per la valutazione di incidenza con nuove evidenze scientifiche. Il programma di monitoraggio, che deve essere articolato sulla base di argomenti definiti dalla DGR, viene sottoposto all'autorità regionale per la valutazione di incidenza che provvede a esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.

FASE 1

I progetti previsti dal LIFE14 NAT/IT/000938, che prevedono interventi volti al ripristino e al consolidamento della infrastruttura verde costituita dalla rete di risorgive, rogge, corsi d'acqua e relativi ambienti ripariali ed il recupero della funzionalità dei servizi ecosistemici, nel territorio del Comune di Bressanvido, ricadono all'interno o all'esterno del Sito Rete Natura 2000 denominato SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe".

La Tavola n.8 "Roggia girosa" ricade all'interno del SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe". Il SIC si sovrappone in parte alla ZPS denominata IT3220013 "Bosco di Dueville", sito che però non risulta coinvolto dagli interventi previsti dal progetto in quanto localizzato ad ovest e ricadente nei Comuni di Dueville, Villaverla e Caldogno.

Poiché il progetto non è "direttamente connesso o necessario alla gestione del sito" e non presenta le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2 dell'Allegato A della D.G.R. 2299/2014 "Piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza", si procede con la selezione preliminare detta anche *screening*.

FASE 2 – Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti

2.1 Descrizione del piano, progetto o intervento

2.1.1 Inquadramento territoriale

Le risorgive oggetto di valutazione ricadono all'interno del Comune di Bressanvido. Le risorgive sono un elemento caratterizzante di alcune zone della pianura padana e costituiscono un'importante fonte idrica, di qualità, utilizzata sia a scopo irriguo che potabile.

Esse costituiscono un importante fattore di ricarica della falda e danno origine a corsi d'acqua e fiumicelli che si irradiano nel territorio e spesso sono inseriti in contesti di prati stabili irrigui, che garantiscono un impatto ambientale molto più ridotto rispetto ad altre colture agrarie.

L'acqua delle risorgive mantengono una temperatura pressochè costante tutto l'anno; in inverno infatti le specie vegetali che crescono in acqua e lungo la riva saltano all'occhio per il loro verde intenso mentre in estate la vegetazione, che circonda le risorgive, fornisce ambienti freschi.

Le risorgive inoltre costituiscono luogo di eccezionale valenza ecologica e sono sede di habitat e habitat di specie sia per la flora che per la fauna.

Per quanto riguarda la vegetazione sono presenti specie acquatiche, sia radicate al fondo e sommerse, sia dotate di parti affondate nel substrato del fontanile, sia liberamente flottanti o natanti nell'acqua, e specie terrestri che generalmente sono presenti sulle rive sia nel capofonte che lungo il relativo corso d'acqua (asta) e che spesso hanno una funzione di filtro biologico per le attività agricole.

2.1.2 Finalità dell'intervento

La risorgiva Roggia Girosa è di tipo perenne ed è caratterizzata da n. 5 capofonte e dell'asta della risorgiva, la portata complessiva risulta buona e ricade in un contesto di prati. L'obiettivo del progetto, per questa risorgiva, prevede interventi di tipo C ossia riqualificazione ambientale dell'ambito di risorgiva e del fiume. Come indicato nel Progetto LIFE, i capofonte, di seguito descritti, sono individuati con i codici CR11, CR12, CR13, CR14 e CR15.

In alcuni tratti dell'asta verranno posizionati, nel corso delle operazioni, dei deflettori e costrittori con lo scopo di restringere e approfondire l'alveo, assecondare le sequenze di buche e raschi, creare delle barre per favorire la vegetazione riparia e indirizzare la corrente in punti di particolare valore ecologico. Per la messa in alveo dei deflettori e costrittori verranno utilizzati materiali disponibili in loco quali pali di castagno e massi.

I pali di castagno verranno ancorati alle rive e dovranno penetrare per circa 1/3 della lunghezza mentre il lato rivolto verso monte dovrà essere inclinato di 30°-40° gradi rispetto alla direzione della corrente. l'angolo tra il lato a monte e quello a valle dovrà essere di circa 90°. I pali verranno fissati tra loro con assi e chiodi.

In alcuni tratti inoltre verrà posizionato del pietrame (Sassi e massi) di volume adeguato in alveo, in relazione alle caratteristiche dinamiche della corrente, al fine di creare delle zone di rifugio per pesci. Tale intervento sarà individuato e realizzato in fase di cantiere.




Figura 1: Dettaglio deflettori, costrittori e massi

Deflettori e costrittori saranno realizzati tenendo ben presente il livello idrico medio in modo che nei periodi in cui il deflusso sarà maggiore verranno coperti (seppur di poco) dall'acqua, mentre la restante parte dell'anno risultino emergenti di poco dal livello dell'acqua.

I sassi hanno la funzione di rompere il flusso d'acqua e di fornire riparo e protezione alle specie ittiche, dato che la risorgiva non presenta anfratti o zone di rifugio per le specie ittiche data la sua conformazione molto regolare.




Figura 2: Dettaglio costruttivo deflettori e costrittori

2.1.3 Aree direttamente interessate dall'intervento

Le aree interessate dalle azioni degli interventi, che prevedono interventi volti al ripristino e al consolidamento della infrastruttura verde costituita dalla rete di risorgive, rogge, corsi d'acqua e relativi ambienti ripariali ed il recupero della funzionalità dei servizi ecosistemici, sono strettamente collegate all'ambiente delle risorgive che ricadono all'interno del Comune di Bressanvido. Per ambiente di risorgiva si intende sia la matrice acqua che le zone spondali e, dove possibile, anche aree da rimboschire e rinfoltire prossime e connesse delle stesse.

Nella Tavola n.8 "Roggia Girosa" la posa di deflettori, costrittori e sassi e massi internamente all'asta sono previsti in diversi punti della roggia come si evince dalla figura di seguito riportata.




Figura 3: Area interessata dall'intervento di posa di deflettori, costrittori e sassi e massi

2.1.4 Uso del suolo nelle aree direttamente interessate

Le aree interessate dagli interventi ricadono in un contesto agricolo. Le superfici sono caratterizzate dai corpi idrici delle risorgive, il tratto arginale delle aste di risorgiva e dalle aree agricole in connessione con le stesse.

2.1.5 Caratteristiche dimensionali dell'intervento

L'intervento interessa l'ambiente delle risorgive che ricadono all'interno del Comune di Bressanvido. Per ambiente di risorgiva si intende sia la matrice acqua che le zone spondali che interessa la Roggia Girosa in aree localizzate come evidenziato dall'Allegato 1 di progetto.

2.1.6 Durata dell'attuazione e cronoprogramma dell'intervento

Gli interventi per la realizzazione delle opere, previsti per le risorgive, saranno realizzati tra il 2017 e 2019; i lavori verranno effettuati in giorni non continui e nei mesi compresi tra gennaio e agosto fino a marzo dello stesso anno. Non si prevede l'apertura di cantieri per la realizzazione degli interventi.

2.1.7 Utilizzo delle risorse (rinnovabili e non rinnovabili)

Gli interventi previsti dal progetto LIFE non utilizzano, di fatto, risorse naturali del SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" in quanto le azioni previste non ricadono all'interno del Sito Rete Natura 2000. Si prevedono inoltre azioni volte al ripristino e al consolidamento della rete di risorgive, rogge, corsi d'acqua e relativi ambienti ripariali ed il recupero della funzionalità dei servizi ecosistemici.

2.1.8 Fabbisogno nel campo dei trasporti, viabilità e reti infrastrutturali

La realizzazione delle opere richiederà l'utilizzo di mezzi necessari per i movimenti terra, trasporto materiali inerti e realizzazione percorsi pedonali, di seguito elencati:

- mini escavatore cingolato da 80q;
- escavatore cingolato da 165q;
- autocarro cassonato con portata fino a 100q.

Per quanto riguarda le attività di manutenzione, gli interventi di pulizia, dove possibile, verranno fatti manualmente.

2.1.9 Relazioni con ulteriori piani, progetti o interventi

Non vi sono relazioni con ulteriori piani, progetti e/o interventi.

2.2 Identificazione e misura degli effetti dei fattori perturbativi originati dalle azioni dell'intervento

In relazione ai contenuti del progetto ciascuno dei fattori riportati all'allegato B della D.G.R. 2299/14 è stato analizzato per verificarne l'eventuale sussistenza.

L'analisi ha restituito i seguenti fattori pressioni, minacce e attività che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/CE, sia per la fase di cantiere che di esercizio.

CODICE	DESCRIZIONE	Fase del cronoprogramma
H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari	Fase cantiere

2.2.1 Fase di cantiere

Il fattori di pressioni considerati durante la fase di cantiere viene di seguito descritto.

H06.01.01: Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

In riferimento all'inquinamento acustico invece, durante la fase di cantiere l'aumento temporaneo dell'inquinamento acustico ed atmosferico avverrà nelle zone circostanti le aree di intervento. Queste emissioni acustiche a loro volta comporteranno possibile disturbo all'avifauna e alla mammofauna presente lungo il tratto di risorgiva.

2.2.2 Fase di esercizio

Non sono stati individuati fattori di pressioni nel la fase di esercizio.

Le potenziali alterazioni, in fase di cantiere, sulle componenti ambientali prossime al Sito Rete Natura 2000 sono identificabili, in forma sintetica, come segue:

AZIONI DELL'INTERVENTO	ATTIVITA' PREVISTE	ALTERAZIONI SU ARIA, ACQUA E SUOLO		FATTORI PERTURBATIVI
		Diretti	Indiretti	
Interventi di ripristino e riqualificazione idraulica e morfologica	Posa di deflettori, costrittori e sassi e massi internamente all'asta		X	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori

I valori e i criteri di attribuzione dei parametri che sono stati valutati vengono di seguito descritti e sintetizzati nella tabella sottostante.

H06.01.01: Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari

I criteri di valori di attribuzione considerati per questo fattore sono:

1. Estensione: considerate le aree di intervento e pertanto puntiformi
2. Durata: la durata degli interventi è da considerarsi breve in termini di giorni
3. Magnitudine: L'interferenza coinvolge ambiti puntuali che non ricadono nel sito Natura 2000 ma che comunque è prossimo allo stesso. Essa si esaurisce a breve distanza dal punto di generazione dell'alterazione ambientale; il fattore di interferenza non provoca variazioni rilevanti rispetto alle condizioni in assenza dell'intervento.
4. Periodicità: il fattore di interferenza si manifesta entro limiti temporali definiti e non si ripete periodicamente.
5. Frequenza: il fattore di interferenza si manifesta entro limiti temporali definiti e non si ripete periodicamente.
6. Probabilità di accadimento: in relazione alla distribuzione temporale e all'area di influenza, la probabilità che il fattore di interferenza comporti variazioni rispetto alle condizioni in assenza delle indicazioni previste all'interno dell'area di interferenza potenziale individuato è remota (molto poco probabile, probabilità prossima allo zero).

Fattori di pressione nell'area di intervento							
Codice	Descrizione	Estensione	Durata	Magnitudine Intensità	Periodicità	Frequenza	Prob. Accad.
H Inquinamento							
H06.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori	Area di intervento	Breve termine	Lieve	Concentrata	Concentrata	Remota

Tabella 1: Fattori di pressione considerati che ricadono nell'area di intervento con i rispettivi parametri previsti dalla DGR 2299/2014

2.3 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi

La scelta della dimensione spaziale dell'analisi è stata effettuata sulla base di considerazioni in merito alle possibili interazioni che l'intervento può avere sugli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.

In considerazione delle finalità dello studio d'incidenza ambientale, sono stati presi in considerazione gli effetti degli interventi sulle componenti biotiche dei siti della Rete Natura 2000 interessati dall'intervento.

Gli ambienti interessati dal progetto sono la posa di deflettori, costrittori e sassi e massi internamente all'asta.

Le superfici interessate dagli interventi, in termini spaziali sono:

- .
- per la componente faunistica terrestre l'area di influenza, in riferimento all'inquinamento acustico (H06.01) coincide con l'area che verrà direttamente interessata dall'intervento, ampliata di un'area di interferenza di 30 metri, scelto in via precauzionale considerando il potenziale disturbo sulla fauna dovuto a rumore, vibrazioni ed emissioni in atmosferica dei mezzi di trasporto che si concentreranno nei giorni di cantiere;

Di seguito si riporta l'area complessiva di interferenza del fattore di pressione ed i limiti di interferenza considerati.



Limiti degli effetti dell'inquinamento da rumore e disturbi sonori (H06.01)

Area di progetto

riq. ambientale (C)

Area di interventi

Interventi riqualificazione

Area di interferenza

Area interferenza H06.01

Figura 4: Limiti degli effetti dell'inquinamento da rumore e disturbi sonori (H06.01)

2.4 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente

Non vi sono piani, progetti e/o interventi che possano interagire congiuntamente con il progetto oggetto di valutazione.

FASE 3 - Valutazione della significatività degli effetti

3.1 Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati

Il Sito in cui ricadono gli interventi, sopra descritti al paragrafo 2.1 "Descrizione del piano, progetto o intervento", è il SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe".

Il SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", ricade nella regione biogeografica continentale, si sviluppa per circa 715 ha e nel settore meridionale presenta una forma allungata e frastagliata, legata alla fitta rete di canali e risorgive che lo caratterizzano, mentre a nord l'insieme di tali rogge scorre all'interno del bosco di Dueville e prende quindi una forma più regolare che accorpa quella della ZPS.

Nel sito il paesaggio agrario è caratterizzato dalla presenza di seminativi non irrigui a prevalenza prati da sfalcio e campi di mais che spesso si alternano i filari di siepi. L'area risulta attraversata da polle e canali di risorgiva che confluiscono a valle nel Fiume Bacchiglione e sono presenti zone caratterizzate da praterie umide a Molinia (molinieti su suoli umido-torbose ai margini delle polle e dei corsi d'acqua di risorgiva).

3.1.1 Habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE presenti nel Sito

Il SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", secondo la cartografia ufficiale approvata dalla Regione Veneto (<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rete-natura-2000download>), è rappresentato dalla presenza di habitat di interesse comunitario quali:

- 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*" presente dove la velocità di corrente è più rapida la vegetazione acquatica è rappresentata principalmente da comunità di *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*.
- 6410 "Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinia caerulea*)", habitat rappresentato da comunità erbacee seminaturali che, in assenza di sfalcio, evolvono in tempi anche brevi in comunità legnose riferibili, a seconda del grado di umidità del suolo, delle sue caratteristiche e dell'idrodinamismo, a *Fagetalia sylvaticae* o *Alnetea glutinosae*.
- 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile", habitat rappresentato da comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si sviluppano, in prevalenza, al margine del corso d'acqua.

- 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)" ossia prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo e floristicamente ricchi.

- 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" habitat più strettamente legato all'ambiente fluviale caratterizzato da saliceti, salice bianco e pioppo che si sviluppa linearmente lungo il corso del fiume Lemene principalmente nei tratti superiori dell'asta.

Di seguito, in tabella, si riportano le superfici e le valutazioni degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito.

Tipi di habitat dell'allegato I			Valutazione del sito			
Codice	Superficie [ha]	Qualità dei dati	ABCD	ABC		
			Rappresentatività	Superficie relativa	Grado di conservazione	Valutazione globale
3260	65,21	G	B	C	B	B
6410	0,20	G	C	C	B	B
6430	0,11	G	C	C	B	B
6510	26,64	G	C	C	B	C
91E0	22,15	G	B	C	B	A

Tabella 2: Habitat presenti nel SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"

La qualità e l'importanza del Sito è rappresentata dall'ambito di risorgiva con boschetti, per lo più a sviluppo lineare lungo i fossi ed i canali, e prati umidi (a giunchi e carici). Rogge e canali con vegetazione acquatica delle sorgenti e delle acque lente, e vegetazione di bordura. Presenza significativa di prati da sfalcio, di seminativi ed erbai. L'area umida naturaliforme ricade comunque in contesto fortemente antropizzato (prevalentemente agrario) e risulta essere un importante sito di alimentazione e riproduzione per l'avifauna acquatica.

La distribuzione degli ambienti che caratterizzano l'intera area viene di seguito sintetizzata nella tabella sottostante.

Tipi di habitat	
Classe di habitat	Copertura [%]
corpi d'acqua interni	9,00%
torbiere, stagni, paludi	41,00%
praterie umide, praterie di mesofite	1,00%
colture cerealicole estensive	7,00%
praterie migliorate	39,00%
arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti)	1,00%
altri (centri abitati, strade, discariche, miniere, aree industriali)	2,00%

Figura 5: distribuzione ambienti naturali

3.1.2 Specie faunistiche e vegetazionali presenti nel Sito

Di seguito si riporta l'elenco delle specie di interesse comunitario e non, presenti allo stato attuale nel Sito sulla base di quanto richiesto dalla DGRV 2299/2014, si riportano tutte le specie elencate all'Allegato A (database georiferito della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto) della D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014 riguardante l'approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6).

Il quadrato in cui ricade l'area di intervento e quindi considerato corrispondone a CellCode 10KME444N250.

Specie	Direttiva Habitat	Direttiva Uccelli	Regno
<i>Lycaena dispar</i> Haworth, 1803	II-IV		Invertebrati
<i>Lampetra zanandreae</i> Vladykov, 1955	II-V		Pesci
<i>Barbus plebejus</i> Bonaparte, 1839	II-V		Pesci
<i>Protochondrostoma genei</i> Bonaparte, 1839	II		Pesci
<i>Cobitis bilineata</i> L., 1758	II		Pesci
<i>Sabanejewia larvata</i> De Filippi, 1859	II		Pesci
<i>Cottus gobio</i> L., 1758	II		Pesci
<i>Triturus carnifex</i> Laurenti, 1768	II-IV		Erpetofauna
<i>Bufo viridis</i> Laurenti, 1768	IV		Erpetofauna
<i>Hyla intermedia</i> Boulenger, 1882	IV		Erpetofauna
<i>Rana dalmatina</i> Bonaparte, 1840	IV		Erpetofauna
<i>Rana latastei</i> Boulenger, 1879	II-IV		Erpetofauna
<i>Pelophylax synkl. esculentus</i> L., 1758	V		Erpetofauna
<i>Emys orbicularis</i> L., 1758	II-IV		Erpetofauna
<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	IV		Erpetofauna
<i>Podarcis muralis</i> Laurenti, 1768	IV		Erpetofauna
<i>Podarcis siculus</i> Raf., 1810	IV		Erpetofauna
<i>Hierophis viridiflavus</i> Lacpde, 1789	IV		Erpetofauna
<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	IV		Erpetofauna
<i>Zamenis longissimus</i> Laurenti, 1768	IV		Erpetofauna
<i>Natrix tessellata</i> Laurenti, 1768	IV		Erpetofauna
<i>Anas platyrhynchos</i> L., 1758		IIA-IIIA	Avifauna
<i>Perdix perdix</i> L., 1758		IIA-IIIA	Avifauna
<i>Coturnix coturnix</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Phasianus colchicus</i> L., 1758		IIA-IIIA	Avifauna
<i>Ixobrychus minutus</i> L., 1766		I	Avifauna
<i>Nycticorax nycticorax</i> L., 1758		I	Avifauna
<i>Egretta garzetta</i> L., 1766		I	Avifauna
<i>Rallus aquaticus</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Gallinula chloropus</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Fulica atra</i> L., 1758		IIA-IIIB	Avifauna

<i>Vanellus vanellus</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Scolopax rusticola</i> L., 1758		IIA-IIIB	Avifauna
<i>Larus ridibundus</i> L., 1766		IIB	Avifauna
<i>Columba palumbus</i> L., 1758		IIA-IIIA	Avifauna
<i>Streptopelia decaocto</i> Frivaldszky, 1838		IIB	Avifauna
<i>Streptopelia turtur</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Caprimulgus europaeus</i> L., 1758		I	Avifauna
<i>Alcedo atthis</i> L., 1758		I	Avifauna
<i>Calandrella brachydactyla</i> Leisler, 1814		I	Avifauna
<i>Turdus merula</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Turdus viscivorus</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Lanius collurio</i> L., 1758		I	Avifauna
<i>Garrulus glandarius</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Pica pica</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Corvus monedula</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Sturnus vulgaris</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> Schreber, 1774	II-IV		Mammofaun
<i>Myotis capaccinii</i> Bonaparte, 1837	II-IV		Mammofaun
<i>Myotis daubentonii</i> Leisler, 1819	IV		Mammofaun
<i>Myotis myotis</i> Borkhausen, 1797	II-IV		Mammofaun
<i>Pipistrellus kuhlii</i> Kuhl, 1817	IV		Mammofaun
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> Schreber, 1774	IV		Mammofaun
<i>Hypsugo savii</i> Bonaparte, 1837	IV		Mammofaun
<i>Eptesicus serotinus</i> Schreber, 1774	IV		Mammofaun
<i>Plecotus auritus</i> L., 1758	IV		Mammofaun
<i>Tadarida teniotis</i> Raf., 1814	IV		Mammofaun
<i>Muscardinus avellanarius</i> L., 1758	IV		Mammofaun
<i>Hystrix cristata</i> L., 1758	IV		Mammofaun
<i>Mustela putorius</i> L., 1758	V		Mammofaun
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753			Plantae
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753			Plantae
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753			Plantae
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799			Plantae
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783			Plantae
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807			Plantae
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879			Plantae
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753			Plantae
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753			Plantae
<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753			Plantae
<i>Asplenium onopteris</i> L., 1753			Plantae
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753			Plantae
<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753			Plantae
<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753			Plantae
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799			Plantae
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1958			Plantae
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834			Plantae
<i>Laurus nobilis</i> L., 1753			Plantae
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002			Plantae
<i>Neottia ovata</i> Bluff & Fingerh., 1838			Plantae

<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785			Plantae
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789			Plantae
<i>Carex distans</i> L., 1759			Plantae
<i>Carex hirta</i> L., 1753			Plantae
<i>Carex leporina</i> L., 1753			Plantae
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762			Plantae
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812			Plantae
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud., 1841			Plantae
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819			Plantae
<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753			Plantae
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753			Plantae
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753			Plantae
<i>Lolium perenne</i> L., 1753			Plantae
<i>Phleum pratense</i> L., 1753			Plantae
<i>Poa trivialis</i> L., 1753			Plantae
<i>Caltha palustris</i> L., 1753			Plantae
<i>Clematis vitalba</i> L., 1753			Plantae
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753			Plantae
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753			Plantae
<i>Ranunculus reptans</i> L., 1753			Plantae
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L., 1753			Plantae
<i>Platanus hispanica</i> Mill. ex Mnchh., 1770			Plantae
<i>Euonymus europaea</i> L., 1753			Plantae
<i>Populus nigra</i> L., 1753			Plantae
<i>Salix alba</i> L., 1753			Plantae
<i>Salix cinerea</i> L., 1753			Plantae
<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774			Plantae
<i>Juglans regia</i> L., 1753			Plantae
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1791			Plantae
<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753			Plantae
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753			Plantae
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753			Plantae
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753			Plantae
<i>Trifolium repens</i> L., 1753			Plantae
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775			Plantae
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755			Plantae
<i>Rubus caesius</i> L., 1753			Plantae
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818			Plantae
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768			Plantae
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753			Plantae
<i>Parietaria officinalis</i> L., 1753			Plantae
<i>Urtica dioica</i> L., 1753			Plantae
<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753			Plantae
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753			Plantae
<i>Acer campestre</i> L., 1753			Plantae
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753			Plantae
<i>Rumex crispus</i> L., 1753			Plantae
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799			Plantae
<i>Cucubalus baccifer</i> L., 1753			Plantae

<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811			Plantae
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753			Plantae
<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753			Plantae
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753			Plantae
<i>Symphytum officinale</i> L., 1753			Plantae
<i>Galium mollugo</i> L., 1753			Plantae
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753			Plantae
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753			Plantae
<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753			Plantae
<i>Lamium orvala</i> L., 1759			Plantae
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753			Plantae
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753			Plantae
<i>Mentha longifolia</i> (L.) L., 1756			Plantae
<i>Salvia pratensis</i> L., 1753			Plantae
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810			Plantae
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753			Plantae
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753			Plantae
<i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam., 1779			Plantae
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804			Plantae
<i>Centaurea nigrescens</i> Willd., 1803			Plantae
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769			Plantae
<i>Scorzoneroidea autumnalis</i> (L.) Moench, 1794			Plantae
<i>Picris hieracioides</i> L., 1753			Plantae
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769			Plantae
<i>Hedera helix</i> L., 1753			Plantae
<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753			Plantae
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753			Plantae
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753			Plantae
<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753			Plantae
<i>Cheilymenia theleboloides</i> (Alb. & Schwein.) Boud., 1907			Fungi
<i>Geopora arenosa</i> (Fuckel) S.Ahmad, 1978			Fungi
<i>Hebeloma sacchariolens</i> Qul., 1880			Fungi
<i>Hemipholiota populnea</i> (Pers.) Bon, 1986			Fungi
<i>Inocybe mixtilis</i> (Britzelm.) Sacc., 1887			Fungi
<i>Mycenastrum corium</i> (Guers.) Desv., 1842			Fungi
<i>Naucoria escharioides</i> (Fr.) P.Kumm., 1871			Fungi
<i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) Quadr. & Lunghini, 1990			Fungi
<i>Psathyrella pennata</i> (Fr.) A.Pearson & Dennis, 1948			Fungi
<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel, 1979			Fungi
<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo, 2011			Fungi
<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr., 1825			Fungi
<i>Potamonectes elegans</i> Panzer, 1794			Invertebrati
<i>Hister quadrimaculatus</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Atholus bimaculatus</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Neocoenorrhinus germanicus</i> Herbst, 1797			Invertebrati
<i>Epistrophe eligans</i> Harris, 1780			Invertebrati
<i>Scaeva pyrastris</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Sphaerophoria scripta</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822			Invertebrati

<i>Xanthogramma festivum</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Chrysotoxum cautum</i> Harris, 1776			Invertebrati
<i>Chrysotoxum vernale</i> Loew, 1841			Invertebrati
<i>Pyrgus armoricanus</i> Oberthr, 1910			Invertebrati
<i>Pyrgus malvae</i> L. 1758 / <i>Pyrgus malvoides</i> Elwes & Edwards, 1897			Invertebrati
<i>Spialia sertorius</i> Hoffmannsegg, 1804			Invertebrati
<i>Carcharodus alceae</i> Esper, 1780			Invertebrati
<i>Ochlodes sylvanus</i> Esper, 1777			Invertebrati
<i>Papilio machaon</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Iphiclides podalirius</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Aporia crataegi</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Pieris brassicae</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Pieris bryoniae</i> Hbner, 1806 / <i>Pieris napi</i> L. 1758			Invertebrati
<i>Pieris mannii</i> Mayer, 1851			Invertebrati
<i>Pieris rapae</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Pontia edusa</i> J.Fabr., 1777			Invertebrati
<i>Anthocharis cardamines</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Colias alfacariensis</i> Berger, 1948 / <i>Colias hyale</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785			Invertebrati
<i>Gonepteryx rhamni</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Leptidea juvernica</i> Williams, 1946 / <i>Leptidea sinapis</i> L. 1758			Invertebrati
<i>Lycaena phlaeas</i> L., 1761			Invertebrati
<i>Leptotes pirithous</i> L., 1767			Invertebrati
<i>Cupido argiades</i> Pall., 1771			Invertebrati
<i>Celastrina argiolus</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Plebejus argus</i> L. 1758 / <i>Plebejus argyrognomon</i> Bergstrsner, 17			Invertebrati
<i>Aricia agestis</i> Denis & Schiffermüller, 1775			Invertebrati
<i>Polyommatus bellargus</i> Rottemburg, 1775			Invertebrati
<i>Polyommatus icarus</i> Rottemburg, 1775			Invertebrati
<i>Nymphalis antiopa</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Nymphalis polychloros</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Aglais io</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Vanessa atalanta</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Vanessa cardui</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Aglais urticae</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Polygonia c-album</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Polygonia egea</i> Cramer, 1775			Invertebrati
<i>Issoria lathonia</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Melitaea athalia</i> Rottemburg, 1775			Invertebrati
<i>Melitaea didyma</i> Esper, 1779			Invertebrati
<i>Melitaea phoebe</i> Goeze, 1779			Invertebrati
<i>Apatura ilia</i> Denis & Schiffermüller, 1775			Invertebrati
<i>Brintesia circe</i> J.Fabr., 1775			Invertebrati
<i>Maniola jurtina</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Coenonympha pamphilus</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Pararge aegeria</i> L., 1758			Invertebrati
<i>Lasiommata megera</i> L., 1767			Invertebrati
<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898			Invertebrati
<i>Anguilla anguilla</i> L., 1758			Pesci

<i>Alburnus alburnus</i> L., 1758			Pesci
<i>Carassius auratus</i> L., 1758			Pesci
<i>Leuciscus cephalus</i> L., 1758			Pesci
<i>Phoxinus phoxinus</i> L., 1758			Pesci
<i>Rutilus erythrophthalmus</i> Zerunian, 1982			Pesci
<i>Tinca tinca</i> L., 1758			Pesci
<i>Esox lucius</i> L., 1758			Pesci
<i>Oncorhynchus mykiss</i> Walbaum, 1792			Pesci
<i>Salmo trutta</i> L., 1758			Pesci
<i>Gasterosteus aculeatus</i> L., 1758			Pesci
<i>Knipowitschia punctatissima</i> Canestrini, 1864			Pesci
<i>Padogobius martensii</i> Gnther, 1861			Pesci
<i>Salamandra salamandra</i> L., 1758			Erpetofauna
<i>Lissotriton vulgaris</i> L., 1758			Erpetofauna
<i>Bufo bufo</i> L., 1758			Erpetofauna
<i>Anguis fragilis</i> L., 1758			Erpetofauna
<i>Natrix natrix</i> L., 1758			Erpetofauna
<i>Phalacrocorax carbo</i> L., 1758			Avifauna
<i>Ardea cinerea</i> L., 1758			Avifauna
<i>Tachybaptus ruficollis</i> Pall., 1764			Avifauna
<i>Podiceps cristatus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Accipiter nisus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Buteo buteo</i> L., 1758			Avifauna
<i>Falco tinnunculus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Falco subbuteo</i> L., 1758			Avifauna
<i>Charadrius dubius</i> Scop., 1786			Avifauna
<i>Actitis hypoleucos</i> L., 1758			Avifauna
<i>Cuculus canorus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Tyto alba</i> Scop., 1769			Avifauna
<i>Otus scops</i> L., 1758			Avifauna
<i>Athene noctua</i> Scop., 1769			Avifauna
<i>Strix aluco</i> L., 1758			Avifauna
<i>Asio otus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Apus apus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Merops apiaster</i> L., 1758			Avifauna
<i>Upupa epops</i> L., 1758			Avifauna
<i>Jynx torquilla</i> L., 1758			Avifauna
<i>Picus viridis</i> L., 1758			Avifauna
<i>Dendrocopos major</i> L., 1758			Avifauna
<i>Galerida cristata</i> L., 1758			Avifauna
<i>Riparia riparia</i> L., 1758			Avifauna
<i>Ptyonoprogne rupestris</i> Scop., 1769			Avifauna
<i>Hirundo rustica</i> L., 1758			Avifauna
<i>Delichon urbica</i> L., 1758			Avifauna
<i>Anthus pratensis</i> L., 1758			Avifauna
<i>Motacilla flava</i> L., 1758			Avifauna
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771			Avifauna
<i>Motacilla alba</i> L., 1758			Avifauna
<i>Cinclus cinclus</i> L., 1758			Avifauna

<i>Troglodytes troglodytes</i> L., 1758			Avifauna
<i>Erithacus rubecula</i> L., 1758			Avifauna
<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm, 1831			Avifauna
<i>Phoenicurus ochruros</i> Gmelin, 1789			Avifauna
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Saxicola torquatus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Cettia cetti</i> Temminck, 1820			Avifauna
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> Hermann, 1804			Avifauna
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Hippolais polyglotta</i> Vieillot, 1817			Avifauna
<i>Sylvia atricapilla</i> L., 1758			Avifauna
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787			Avifauna
<i>Phylloscopus collybita</i> Vieillot, 1817			Avifauna
<i>Muscicapa striata</i> Pall., 1764			Avifauna
<i>Aegithalos caudatus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Parus caeruleus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Parus major</i> L., 1758			Avifauna
<i>Sitta europaea</i> L., 1758			Avifauna
<i>Remiz pendulinus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Oriolus oriolus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Corvus cornix</i> L., 1758		IIB	Avifauna
<i>Passer italiae</i> Vieillot, 1817			Avifauna
<i>Passer montanus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Fringilla coelebs</i> L., 1758			Avifauna
<i>Fringilla montifringilla</i> L., 1758			Avifauna
<i>Serinus serinus</i> L., 1766			Avifauna
<i>Chloris chloris</i> L., 1758			Avifauna
<i>Carduelis carduelis</i> L., 1758			Avifauna
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> L., 1758			Avifauna
<i>Emberiza citrinella</i> L., 1758			Avifauna
<i>Emberiza schoeniclus</i> L., 1758			Avifauna
<i>Emberiza calandra</i> L., 1758			Avifauna
<i>Erinaceus europaeus</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Sorex antinorii</i> Bonaparte, 1840 / <i>Sorex araneus</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907			Mammofaun
<i>Crocidura leucodon</i> Hermann, 1780			Mammofaun
<i>Crocidura suaveolens</i> Pall., 1811			Mammofaun
<i>Talpa europaea</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Oryctolagus cuniculus</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Lepus europaeus</i> Pall., 1778			Mammofaun
<i>Sciurus vulgaris</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Glis glis</i> L., 1766			Mammofaun
<i>Arvicola amphibius</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Arvicola terrestris</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Microtus arvalis</i> Pall., 1779			Mammofaun
<i>Apodemus sylvaticus</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Rattus norvegicus</i> Berkenhout, 1769			Mammofaun
<i>Rattus rattus</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782			Mammofaun

<i>Vulpes vulpes</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Meles meles</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Mustela nivalis</i> L., 1766			Mammofaun
<i>Neovison vison</i> Schreber, 1777			Mammofaun
<i>Martes foina</i> Erxleben, 1777			Mammofaun
<i>Sus scrofa</i> L., 1758			Mammofaun
<i>Capreolus capreolus</i> L., 1758			Mammofaun

Tabella 3: Specie animali e vegetali indicate secondo Allegato A della D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014

Le specie animali individuate nel sito con il nuovo formulario SORBA, di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e all'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e altre specie, vengono di seguito elencate:

Specie			Popolazione sul sito						Valutazione del sito			
Gruppo	Codice	Nome scientifico	Tipo	Dimensioni		Unità	Cat. Di abbondanza	Qualità dei dati	ABCD	ABC		
				Min	Max		CRPV			Popolazione	Conservazione	Isolamento
A	1215	<i>Rana latastei</i>	p				C	G	C	B	C	B
B	A072	<i>Pernis apivorus</i>	c				P	DD	D			
B	A697	<i>Egretta garzetta</i>	c				P	DD	D			
B	A698	<i>Egretta garzetta</i>	w				P	DD	D			
B	A229	<i>Alcedo atthis</i>	p	2	4	p	C	G	C	B	C	B
B	A073	<i>Milvus migrans</i>	c				R	DD	D			
B	A610	<i>Nycticorax nycticorax</i>	c	20	25	i	C	G	C	B	C	B
F	1163	<i>Cottus gobio</i>	P				C	G	B	B	C	A
F	1131	<i>Telestes muticellus</i>	P				P	G	C	B	C	B
F	1115	<i>Protochondrostoma genei</i>	C				R	G	D			
F	1137	<i>Barbus plebejus</i>	C				R	G	D			
B	A098	<i>Falco columbarius</i>	C						D			
B	A084	<i>Circus pygargus</i>	C						D			
B	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	C						D			
B	A151	<i>Philomachus pugnax</i>	C						D			
B	A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	C						D			
B	A082	<i>Circus cyaneus</i>	C						D			
B	A094	<i>Pandion haliaetus</i>	C						D			
B	A166	<i>Tringa glareola</i>	C						D			
B	A272	<i>Luscinia svecica</i>	C						D			
B	A221	<i>Asio otus</i>	P				P	DD				
B	A340	<i>Lanius excubitor</i>	P				P	DD				
B	A214	<i>Otus scops</i>	C				P	DD				
B	A118	<i>Rallus aquaticus</i>	P				P	DD				
B	A155	<i>Scolopax rusticola</i>	C				P	DD				
B	A213	<i>Tyto alba</i>	P				P	DD				
F	1149	<i>Cobitis taenia</i>	P				P	DD				

Tabella 4: specie di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e all'allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Specie									Motivazione								
Gruppo	Codice	Nome scientifico	S	N	Dimensioni		Unità	Cat. di abbondanza	Allegato specie		Altre categorie						
					Min	Max			CRPV	IV	V	A	B	C	D		
Uccelli	1210	Casmerodius albus						c									X
Uccelli	A699	Ardea cinerea						c									X
Uccelli	A704	Anas crecca						c									X
Uccelli	A738	Delichon urbicum						c				X					
Uccelli	A262	Motacilla alba						c									X
Uccelli	A261	Motacilla cinerea						c									X
Uccelli	A153	Gallinago gallinago						c									X
Uccelli	A300	Hippolais polyglotta						r									X
Uccelli	A297	Acrocephalus scirpaceus			1	2	p	r									X
Uccelli	A296	Acrocephalus palustris			4	6	p	c									X
Uccelli	A298	Acrocephalus arundinaceus						v				X					
Uccelli	A311	Sylvia atricapilla			8	12	p	c									X
Uccelli	A364	Carduelis carduelis						C									X
Uccelli	A330	Parus major			5	10	p	c									X
Uccelli	A329	Cyanistes caeruleus			5	10	p	c									X
Uccelli	A324	Aegithalos caudatus			3	10	p	c									X
Uccelli	A274	Phoenicurus phoenicurus			1	3	p	c									X
Uccelli	A687	Columba palumbus						c									X
Uccelli		Corvus corone cornix			1	1	p	c									X
Uccelli	A726	Charadrius dubius						r				X					
Uccelli	A212	Cuculus canorus			2	4	i	c				X					
Uccelli	A260	Motacilla flava			1	2	p	c									X
Uccelli	A115	Phasianus colchicus			2	4	i	c									X
Uccelli	A723	Fulica atra			2	5	p	c									
Uccelli	A657	Fringilla coelebs			5	10	p	c									X
Uccelli	A373	Coccothraustes coccothraustes						c									X
Uccelli	A721	Gallinula chloropus			5	10	p	c									X
Uccelli	A343	Pica pica			1	2	p	c									X
Uccelli	A705	Anas platyrhynchos			4	8	p	c									X
Uccelli	A096	Falco tinnunculus			1	1	p	c									X
Uccelli	A230	Merops apiaster						c									X
Uccelli	A099	Falco subbuteo			1	1	p	r									X
Uccelli	A365	Carduelis spinus						c									X
Uccelli	A315	Phylloscopus collybita						c									X
Uccelli	A316	Phylloscopus trochilus						c									X
Uccelli	A283	Turdus merula						c									X
Uccelli	A381	Emberiza shoeniclus						r									X
Uccelli	A356	Passer montanus						r				X					X
Uccelli		Passer italiae						r				X					
Uccelli	A360	Fringilla montifringilla						r									X
Uccelli	A269	Erithacus rubecula						c									X
Uccelli	A658	Dendrocopos major			2	4	p	c									X

Uccelli	A235	<i>Picus viridis</i>		2	4	p	c						X
Uccelli	A206	<i>Columba livia</i>					r						X
Uccelli	A165	<i>Tringa ochropus</i>					r						X
Uccelli	A087	<i>Buteo buteo</i>		1	1	p	c						X
Uccelli	A317	<i>Regulus regulus</i>					c						X
Uccelli	A251	<i>Hirundo rustica</i>					c			X			
Uccelli	A226	<i>Apus apus</i>					c			X			
Uccelli	A676	<i>Troglodytes troglodytes</i>					c						X
Uccelli	A633	<i>Accipiter nisus</i>					r						X
Uccelli	A351	<i>Sturnus vulgaris</i>					c						X
Uccelli	A233	<i>Jynx torquilla</i>					r			X			
Uccelli	A209	<i>Streptopelia decaocto</i>					c						X
Uccelli	A210	<i>Streptopelia turtur</i>		8	12		c			X			
Uccelli	A396	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		5	10		c						X
Uccelli	A232	<i>Upupa epops</i>		1	1		r						X
Uccelli	A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>		8	12		c						X
Uccelli	A288	<i>Cettia cetti</i>		10	15		c						X
Uccelli	A745	<i>Carduelis chloris</i>		1	4		c			X			
Uccelli	A361	<i>Serinus serinus</i>		4	6		c						X
Anfibi	1210	<i>Pelophylax esculentus</i>					P		V				X
Anfibi	1203	<i>Hyla intermedia</i>					P					X	
Anfibi	1209	<i>Rana dalmatina</i>					P	IV				X	
Rettili	1256	<i>Podarcis muralis</i>					P	IV					X
Rettili	1263	<i>Lacerta bilineata</i>					P	IV					X
Rettili		<i>Natrix natrix</i>					P					X	
Rettili	1292	<i>Natrix tessellata</i>					P	IV					X
Rettili	1284	<i>Hierophis viridiflavus</i>					P	IV					X
Pesci		<i>Gasterosteus gymnotus</i>					P						X
Pesci		<i>Knipowitschia punctatissima</i>					C				X		X
Pesci		<i>Padogobius martensii</i>					P				X		X
Piante		<i>Allium angulosum</i>					R			X			
Piante		<i>Caltha palustris</i>					R						X
Piante		<i>Leucojum aestivum</i>					R						X
Piante		<i>Allium suaveolens</i>					V					X	
Piante		<i>Cardamine hayneana</i>					R						X
Piante		<i>Carex davalliana</i>					P						X
Piante		<i>Cirsium palustre</i>					C						X
Piante		<i>Crepis paludosa</i>					R						X
Piante		<i>Cucubalus baccifer</i>					R						X
Piante		<i>Epipactis palustris</i>					R						X
Piante		<i>Eriophorum latifolium</i>					V						X
Piante		<i>Parnassia palustris</i>					C						X
Piante		<i>Valeriana dioica</i>					C						X
Piante		<i>Sanguisorba officinalis</i>					R						X

Tabella 5: Altre specie presenti nel Sito

3.1.3 Assetto vegetazionale dell'area di analisi

Roggia Girosa: CR11, CR12, CR13, CR14 e CR15

CR11: Il capofonte è situato ad ovest della roggia Girosa e presenta n. 4 polle con tubo di risalita. Lungo le sponde sono presenti specie arboree come platani (*Platanus* sp.), robinia (*Robinia pseudoacacia*), salice bianco (*Salix alba*), frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*), noce europeo (*Juglans regia*), ed orniello (*Fraxinus ornus*). La vegetazione acquatica rinvenuta è caratterizzata da crescione d'acqua (*Nasturtium officinale*) e menta acquatica (*Mentha aquatica*).




Figura 6: Capofonte CR11

CR12: Il capofonte è situato ad nord della roggia Girosa e presenta n. 1 polla con tubo di risalita. La testa della risorgiva risulta circolare con l'asta avente lunghezza di 40m circa fino alla confluenza con l'asta del capofonte CR13. Lungo le rive sono presenti specie legnose quali sambuco (*Sanbucus nigra*), robinia e gelso. Presenti inoltre specie arboree morte e numerose ortiche (*Urtica dioica*). Presenza di numerose alghe nell'ambiente acquatico.




Figura 7: Capofonte CR12

CR13: Il capofonte è situato ad nord-est della roggia Giosa e presenta n. 4 polle con tubo di risalita. La testa della risorgiva risulta circolare ma allungata con l'asta avente lunghezza maggiore di 100m. Lungo le rive di destra sono presenti essenze di robinia, gelso, sambuco, e salice mentre in sponda sinistra non sono presenti specie legnose e le specie dominanti sono le erbacee come l'ortica.




Figura 8: Capofonte CR13

CR14: Il capofonte è situato ad sud-est della roggia Giosa e sulle rive sono presenti luppolo (*Humulus lupulus*), sambuco e ontano nero (*Alnus glutinosa*). Tutta la sponda sinistra della risorgiva è priva di vegetazione arborea e le specie dominanti sono in prevalenza rovi e ortiche. La testa della risorgiva risulta quasi lineare con l'asta avente lunghezza di 35m circa fino alla confluenza con l'asta principale. Presente inoltre il crescione d'acqua e la menta acquatica.




Figura 9: Capofonte CR14

CR15: Il capofonte è situato ad sud della roggia. La testa della risorgiva risulta quasi lineare con l'asta avente lunghezza di 30m circa fino alla confluenza con l'asta principale. Le specie vegetali presenti sulla rive destra sono un rovere (*Quercus petraea*) con tronco ricoperto da edera e robinia. Tra gli arbusti sono presenti il sambuco, il pallon di maggio (*Viburnum opulus*) e luppolo mentre in sponda sinistra del capofonte non ci sono alberi ne arbusti ma piante erbacee le ortiche.




Figura 10: Capofonte CR15

Per quanto riguarda l'intera asta della roggia, nel tratto a nord e sud del sistema risorgiva, sono state rinvenute le stesse specie sopra elencate e presenti nei capofonte con presenza anche di acero campestre (*Acer campestre*). La specie che meglio rappresenta i due tratto è senza

dubbio il platano che in alcuni casi assume dimensioni significative a dimostrazione del fatto che il suo utilizzo è radicato da decenni. La loro distribuzione, lungo le sponde dell'asta, risulta discontinua in entrambe le rive. Il tratto centrale dell'asta invece è rappresentato soprattutto da ontano nero.





Figura 11: Tratti dell'asta del sistema risorgive della Giosa


3.1.4 Habitat in nell'Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE presenti nell'area di intervento

L'area di intervento ricade all'interno del Sito Rete Natura 2000 SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"; gli interventi ricadono all'interno dell'habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitrichon-Batrachion*".



Siti Rete Natura 2000 e Area di intervento

Habitat IT3220040



Area di interventi




Figura 12: Habitat dei Siti Rete Natura 2000 presenti nell'area di intervento

3.1.5 Specie faunistiche e vegetazionali presenti nell'area di intervento

Nonostante l'area di intervento non ricada all'interno del Sito, diverso discorso va fatto per la componente faunistica in quanto capace di compiere spostamenti nelle zone circostanti. Per questo motivo di seguito si riporta l'elenco delle specie di interesse comunitario e non, presenti allo stato attuale nell'area interessata dall'intervento.

Uccelli

Fra le specie inserite nell'Allegato I di particolare interesse e presenti nell'area di intervento si sono osservati il martin pescatore (*Alcedo atthis*) che può trovare nel reticolo idrografico un ambiente ideale per l'alimentazione, meno per la nidificazione in quanto limitata dall'estensione di ripe scoscese a fianco dei canali utilizzate dalla specie per lo scavo del cunicolo e il l'averla maggiore (*Lanius excubitor*) che predilige ambienti agricoli e vicino alla boscaglia ma non nidificante nell'area (non in Allegato I della Direttiva 2009/147/CE).

Specie come *Pernis apivorus*, *Egretta garzetta*, *Milvus migrans* e *Luscinia svecica* si possono considerare di passaggio nell'area di intervento ma non soggette a disturbo tale da modificarne il comportamento e/o l'allontanamento durante la fase di cantiere.

Tutte le altre specie elencate e considerate non presenti sono da escludersi data la tipologia ambientale rurale dell'area di intervento; queste specie sono presenti nel SIC ma nell'area ovest dove si trovano boschetti planiziali e zone umide (Bosco di Dueville).

Cod.	Nome	Presenza nell'area di intervento	Habitat della specie
A072	<i>Pernis apivorus</i>	NO	Specie presente in boschi igrolifi
A697	<i>Egretta garzetta</i>	SI	Specie presente in zone a basso fondale con canneti e fossati
A229	<i>Alcedo atthis</i>	SI	Specie presente nei fiumi, laghi, fossati, rive di zone umide
A073	<i>Milvus migrans</i>	NO	Specie presente in zone umide
A610	<i>Nycticorax nycticorax</i>	NO	Specie presente in zone umide con canneti e boschi igrolifi
A098	<i>Falco columbarius</i>	NO	Specie che predilige le aree di bassa-media altitudine con vegetazione mista ad alberi
A084	<i>Circus pygargus</i>	NO	Frequenta in riproduzione canneti, paludi, brughiere e campi alberati, zone steppose, savane e coltivi durante lo svernamento.
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	NO	Specie presente in zone umide e supefici di canneto
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	NO	Frequenta praterie umide, paludi, risaie, rive fangose di stagni, laghi e specchi d'acqua in genere.
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	NO	Frequenta prati umidi
A082	<i>Circus cyaneus</i>	NO	Specie presente in zone umide e supefici di canneto

A094	<i>Pandion haliaetus</i>	NO	Frequenta zone umide, praterie, pascoli d'altura, prati umidi
A166	<i>Tringa glareola</i>	NO	Specie presente in zone a basso fondale interne e al bosco igrofilo
A272	<i>Luscinia svecica</i>	SI	Specie che vive in molti habitat in cui siano presenti degli alberi, dalle foreste più fitte alle rade boscaglie
A221	<i>Asio otus</i>	NO	Specie notturna che di giorno cavità degli alberi o in vecchi ruderi in prossimità di boscaglie
A340	<i>Lanius excubitor</i>	SI	Predilige gli ambienti di margine, dove zone aperte sono inframmezzate da siepi, alberate, cespugli, dalla pianura alla media montagna.
A214	<i>Otus scops</i>	NO	Predilige ambienti aperti, talvolta anche aridi. In pianura è presente in piccole radure di frassini, boschi, campagne alberate, parchi e giardini.
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	NO	Specie presenti in canneti e stagni
A155	<i>Scolopax rusticola</i>	NO	Specie di boschi e arbusteti
A213	<i>Tyto alba</i>	NO	Sono uccelli tipici di zone d'aperta campagna e cacciano prevalentemente ai margini dei boschi.

Erpetofauna

La Rana di Lataste è una specie caratteristica delle vaste pianure alluvionali, dove il livello della falda freatica è elevato. La tipologia delle acque nelle quali si riproduce è diversificata e spazia dalle piccole pozze, agli stagni e di norma alimentati da acqua di falda fino ai piccoli corsi d'acqua. Gli habitat favorevoli sono i boschi golenali e altri tipi di boschi umidi e freschi; i tipici boschi misti aperti e freschi di quercia e carpino, con sottobosco erbaceo, sembrano essere i più adatti. Non si esclude però la sua presenza nell'area di intervento. Presente anche la rana verde, la raganella italica, e la rana agile in quanto l'ambiente di risorgiva risulta idoneo alle specie.

Per quanto riguarda i rettili non si esclude la presenza della lucertola muraiola, del ramarro occidentale, del biacco, della natrice dal collare e natrice tassellata presenti in ambienti agricoli e zone caratterizzate da ambienti acquatici.

Cod.	Nome	Presenza nell'area di intervento	Habitat della specie
1215	<i>Rana latastei</i>	NO	La tipologia delle acque nelle quali si riproduce la specie è diversificata e spazia dalle piccole pozze, agli stagni e di norma alimentati da acqua di falda fino ai piccoli corsi d'acqua. Gli habitat favorevoli sono i boschi golenali e altri tipi di boschi umidi e freschi.
1210	<i>Pelophylax esculentus</i>	SI	Predilige fasce perfluviali, stagni e fossati vegetati.
1203	<i>Hyla intermedia</i>	NO	Ampiamente diffusa, predilige boschi ripari e fasce perfluviali; stagni e fossati vegetati e con acque limpide.
1209	<i>Rana dalmatina</i>	NO	Predilige aree boschive e umide.
1256	<i>Podarcis muralis</i>	SI	Ampiamente diffusa, frequenta sia ambienti campestri che aree urbanizzate.
1263	<i>Lacerta bilineata</i>	SI	Frequenta ambienti ecotonali e aree agricole diversificate.

-	<i>Natrix natrix</i>	SI	Diffusa, anche se in modo frammentato, è strettamente legata agli ambienti acquatici.
1292	<i>Natrix tessellata</i>	SI	Diffusa, anche se in modo frammentato, è strettamente legata alle acque correnti.
1284	<i>Hierophis viridiflavus</i>	SI	Ampiamente distribuito in pianura e collina, tollera diversi gradi di disturbo e di copertura arborea.

Fauna ittica e Mammiferi

Nell'area oggetto di studio non sono stati rinvenuti mammiferi ne fauna ittica che rientrano degli allegati della Direttiva Habitat.

3.2 Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione

PATI Comune di Bressanvido e di Pozzoleone

Il Comune di Bressanvido e di Pozzoleone sono disciplinati dal PATI che è stato adottato il 22/04/09, approvato mediante conferenza di servizi il 12/10/121 e ratificato con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 287 in data 23/10/12.

L'area di progetto ricade nella Rete ecologica territoriale ed è disciplinata dall'art. 20.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI, che assegna al Piano degli Interventi (PI) il ruolo di provvedere di identificare e normare, anche con prescrizioni, la tipologia degli interventi da attuare. In particolare l'art. 20.2 del PATI definisce che il PI provvede alla tutela ecologica delle Aree nucleo e ne promuove la fruizione mediante la predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni.

3.3 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono

Gli aspetti vulnerabili dei siti considerati sono riconducibili alla presenza delle specie vegetali e animali significative e degli habitat significativi, come identificati, di seguito, al presente paragrafo. La vulnerabilità è legata in primo luogo all'effettiva presenza degli habitat e delle specie animali (nidificazione/riproduzione e/o alimentazione), in rapporto alle peculiari caratteristiche territoriali dell'area di valutazione. Gli habitat e le specie considerate derivano da fonti bibliografici e da censimenti eseguiti nel tempo.

In relazione alle caratteristiche appena individuate e a quelle dell'ambito di analisi è possibile selezionare gli habitat e le specie vulnerabili.

3.3.1 Habitat e specie vulnerabili hai fattori di pressioni

Nelle tabelle che seguono sono elencati sia gli habitat che le specie presenti coinvolti dall'intervento nella fase di esercizio.

Habitat

L'area di intervento ricade all'interno del Sito Rete Natura 2000 SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" e nello specifico all'interno dell'habita 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitrichon-Batrachion*".

Specie

Di seguito si riportano le specie appartenenti alla sola componente faunistica in quanto non sono state rinvenute specie vegetali di interesse comunitario nelle aree di intervento. Per ogni specie sono stati valutati i diversi fattori di pressione e la possibile alterazione che questi possono comportare alle classi faunistiche.

Uccelli

Cod.	Nome	Presenza nell'area di intervento	Vulnerabilità	Descrizione/Motivazione	Fonte
A072	<i>Pernis apivorus</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC e zone limitrofi come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile durante le fasi di cantiere.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A697	<i>Egretta garzetta</i>	SI	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento (non sono presenti gargaie) ma utilizza il SIC e zone limitrofi come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile durante le fasi di cantiere.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A229	<i>Alcedo atthis</i>	SI	SI	La specie risulta nidificante e presente nel SIC e zone limitrofi tutto l'anno. La fase fenologica e la predilezione della specie per queste tipologie di habitat la rende vulnerabile durante le fasi di cantiere.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A073	<i>Milvus migrans</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC e zone limitrofi come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile durante le fasi di cantiere.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A610	<i>Nycticorax nycticorax</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC, soprattutto l'area del bosco di Dueville, come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A098	<i>Falco columbarius</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A084	<i>Circus pygargus</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione	Atlante degli Uccelli Nidificanti

				della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	della Provincia di Vicenza
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A082	<i>Circus cyaneus</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A166	<i>Tringa glareola</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A272	<i>Luscinia svecica</i>	SI	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC e zone limitrofi come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza

				vulnerabile durante le fasi di cantiere.	
A221	<i>Asio otus</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A214	<i>Otus scops</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A155	<i>Scolopax rusticola</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza
A213	<i>Tyto alba</i>	NO	NO	La specie non nidifica nell'area di intervento ma utilizza il SIC come punto di sosta, di riparo, sosta in fase di migrazione o luogo di muta. La fase fenologica e la predilezione della specie per altre tipologie di habitat rispetto alla matrice rurale permettono di escluderla come specie vulnerabile in quanto non presente.	Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza

Erpetofauna

La Rana di Lataste è una specie caratteristica delle vaste pianure alluvionali, dove il livello della falda freatica è elevato. La tipologia delle acque nelle quali si riproduce è diversificata e spazia dalle piccole pozze, agli stagni e di norma alimentati da acqua di falda fino ai piccoli corsi d'acqua. Gli habitat favorevoli sono i boschi golenali e altri tipi di boschi umidi e freschi; i tipici boschi misti aperti e freschi di quercia e carpino, con sottobosco erbaceo, sembrano essere i più adatti. Non si esclude però la sua presenza nell'area di intervento. Presente anche la rana verde, la raganella italiana, e la rana agile in quanto l'ambiente di risorgiva risulta idoneo alle specie.

Per quanto riguarda i rettili non si esclude la presenza della lucertola muraiola, del ramarro occidentale, del biacco, della natrice dal collare e natrice tassellata presenti in ambienti agricoli e zone caratterizzate da ambienti acquatici.

Cod.	Nome	Presenza nell'area di intervento	Vulnerabilità	Motivazione	Fonte
1215	<i>Rana latastei</i>	NO	NO	La tipologia delle acque nelle quali si riproduce la specie è diversificata e spazia dalle piccole pozze, agli stagni e di norma alimentati da acqua di falda fino ai piccoli corsi d'acqua. Gli habitat favorevoli sono i boschi golenali e altri tipi di boschi umidi e freschi. Si esclude la presenza nell'area di intervento e pertanto da considerarsi non vulnerabile.	Atlante degli anfibii del Veneto
1210	<i>Pelophylax esculentus</i>	SI	SI	Predilige fasce perfluviali, stagni e fossati vegetati. Non si esclude la presenza nell'area di intervento e pertanto da considerarsi vulnerabile in fase di cantiere.	Atlante degli anfibii del Veneto
1203	<i>Hyla intermedia</i>	NO	NO	Ampiamente diffusa, predilige boschi ripari e fasce perfluviali; stagni e fossati vegetati e con acque limpide. Si esclude la presenza nell'area di intervento e pertanto da considerarsi non vulnerabile.	Atlante degli anfibii del Veneto
1209	<i>Rana dalmatina</i>	NO	NO	Predilige aree boschive e umide; Si esclude la presenza nell'area di intervento e pertanto da considerarsi non vulnerabile.	Atlante degli anfibii del Veneto
1256	<i>Podarcis muralis</i>	SI	SI	Ampiamente diffusa, frequenta sia ambienti campestri che aree urbanizzate. Non si esclude la presenza nell'area di intervento e pertanto da considerarsi vulnerabile in fase di cantiere.	Atlante degli anfibii del Veneto
1263	<i>Lacerta bilineata</i>	SI	SI	Frequenta ambienti ecotonali e aree agricole diversificate. Non si esclude la presenza nell'area di intervento e pertanto da considerarsi vulnerabile in fase di cantiere.	Atlante degli anfibii del Veneto
-	<i>Natrix natrix</i>	SI	SI	Diffusa, anche se in modo frammentato, è strettamente legata agli ambienti acquatici. Non si esclude la presenza nell'area di intervento e pertanto da considerarsi vulnerabile in fase di cantiere.	Atlante degli anfibii del Veneto
1292	<i>Natrix tessellata</i>	SI	SI	Diffusa, anche se in modo frammentato, è strettamente legata alle acque correnti. Non si esclude la presenza nell'area di intervento e pertanto da considerarsi vulnerabile in fase di cantiere.	Atlante degli anfibii del Veneto
1284	<i>Hierophis viridiflavus</i>	SI	SI	Ampiamente distribuito in pianura e collina, tollera diversi gradi di disturbo e di copertura arborea. Non si esclude la presenza nell'area di intervento e pertanto da considerarsi vulnerabile in fase di cantiere.	Atlante degli anfibii del Veneto

Sulla base delle presenze e le vulnerabilità riconosciute, di seguito si valutano i diversi fattori di pressione per ogni specie individuata come bersaglio.

Avifauna

Specie	Fattore di pressione	Effetto (Tipo di incidenza)	Diretto/Indiretto	Breve/Lungo termine	Durevole/Reversibile	Fase del cronoprogramma	Effetti sinergici o cumulativi con altri effetti o piani/progetti/interventi	Vulnerabilità (si/no)	Motivazione (legata al grado di conservazione)
<i>Alcedo atthis</i>	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	I mezzi meccanici, comporteranno disturbo e momentaneo allontanamento delle specie in quanto produrranno rumore e vibrazioni nelle aree di cantiere	Indiretto	Breve	Reversibile	Fase di cantiere	Si	Si	Dal momento che la fase di cantiere avverrà in momenti dell'anno, diversi dal periodo della riproduzione, il disturbo delle specie presenti, che dovessero transitare o sostare temporaneamente nell'area di intervento, provocherebbe il semplice spostamento delle stesse in un'altra zona senza modificarne il grado di conservazione.

Erpetofauna

Specie	Fattore di pressione	Effetto (Tipo di incidenza)	Diretto/Indiretto	Breve/Lungo termine	Durevole/Reversibile	Fase del cronoprogramma	Effetti sinergici o cumulativi con altri effetti o piani/progetti/interventi	Vulnerabilità (si/no)	Motivazione (legata al grado di conservazione)
<i>Pelophylax esculentus</i> <i>Podarcis muralis</i> <i>Lacerta bilineata</i> <i>Natrix natrix</i> <i>Natrix tessellata</i> <i>Hieropis viridiflavus</i>	H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori	I mezzi meccanici, comporteranno disturbo e momentaneo allontanamento delle specie in quanto produrranno rumore e vibrazioni nelle aree di cantiere	Indiretto	Breve	Reversibile	Fase di cantiere	Si	Si	Dal momento che la fase di cantiere avverrà in momenti dell'anno, diversi dal periodo della riproduzione, il disturbo delle specie presenti, che dovessero transitare o sostare temporaneamente nell'area di intervento, provocherebbe il semplice spostamento delle stesse in un'altra zona senza modificarne il grado di conservazione.

3.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie

Per la stima della significatività degli effetti sulla conservazione dei siti della Rete Natura 2000, è stata utilizzata la metodologia di valutazione di seguito descritta. Facendo riferimento alla DGR 2299 del 09.12.2014 Allegato A, il metodo adottato prevede di valutare l'entità delle incidenze nei confronti degli elementi bersaglio sulla base dell'individuazione dei tipi di incidenza possibili. La significatività o meno degli effetti diretti ed indiretti su habitat e specie viene valutata in relazione al potenziale cambiamento del grado di conservazione che le azioni di progetto possono indurre per le specie bersaglio già analizzate.

Per quanto riguarda gli Habitat il grado di conservazione, sulla base delle nuove note esplicative per la compilazione del formulario standard (Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C (2011) 4892), è definito come da tabella seguente:

		FUNZIONI		
		prospettive eccellenti	buone prospettive	prospettive mediocri o sfavorevoli
STRUTTURA	eccellente	A	A	A
	ben conservata	A	B	B se ripristino facile o possibile con un impegno medio
				C se ripristino difficile o impossibile
	mediamente o parzialmente degradata	B se ripristino facile o possibile con un impegno medio	B se ripristino facile	C
		C se ripristino difficile	C se ripristino possibile con un impegno medio o difficile	

A: conservazione eccellente, B: buona conservazione, C: conservazione media o limitata

Pertanto per quanto attiene i criteri valutativi della incidenza significativa negativa delle azioni di progetto sugli Habitat, gli effetti saranno considerati avere incidenza significativa negativa quando a livello di sito viene cambiato sfavorevolmente il loro grado di conservazione, in relazione ai sottocriteri indicati nella seguente tabella.

Per quanto riguarda le specie il grado di conservazione, sulla base delle nuove note esplicative per la compilazione del formulario standard (Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C (2011) 4892), è definito come da tabella seguente:

		GRADO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI DELL'HABITAT DI SPECIE		
RIPRISTINO	I: ripristino facile	A	B	B
	II: ripristino possibile con impegno medio	A	B	C
	III: ripristino difficile	A	C	C
A: conservazione eccellente; B: buona conservazione C: conservazione media o limitata				

Pertanto per quanto attiene i criteri valutativi della incidenza significativa negativa degli interventi sulle specie, l'incidenza sarà valutata in relazione alla variazione sfavorevole del grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie, in relazione ai sottocriteri indicati. La conservazione degli elementi importanti per la specie sarà valutata anche in relazione all'andamento della popolazione. Il trend è valutato ove possibile all'interno dell'area di indagine; quando questo non fosse possibile (per assenza di dati di riferimento) viene considerato il trend regionale, nazionale o globale delle varie specie. Qualora sia dimostrato che il trend negativo o non noto sia dovuto a cause non riferibili alle azioni in oggetto, l'incidenza verrà considerata non significativa. I livelli di incidenza potenziale sono classificati in 4 classi alle quali sono abbinati dei colori, per facilitare la lettura di sintesi finale, come da tabella sottostante.

SIGNIFICATIVITÀ DELL'INDICENZA
INCIDENZA SIGNIFICATIVA NEGATIVA ALTA
INCIDENZA SIGNIFICATIVA NEGATIVA MEDIA
INCIDENZA SIGNIFICATIVA NEGATIVA BASSA
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Tabella 6: Livelli di incidenza

Per le specie ed habitat che non sono risultati bersagli per gli interventi in esame l'incidenza è nulla. Il livello di significatività dell'incidenza verrà quindi valutato sulla base della variazione del grado di conservazione del bersaglio, come riportato nella tabella che segue.

VARIAZIONI DEL GRADO DI CONSERVAZIONE DEL BERSAGLIO	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ
Il grado di conservazione dell'Habitat o della specie all'interno dell'area di influenza non subisce variazioni a seguito della realizzazione del progetto	Incidenza non significativa
Il grado di conservazione dell'Habitat o della specie all'interno dell'area di influenza subisce un declassamento a seguito della realizzazione del progetto da Eccellente (A) a Buona (B)	Incidenza bassa
Il grado di conservazione dell'Habitat o della specie all'interno dell'area di influenza subisce un declassamento a seguito della realizzazione del progetto da Buona (B) a conservazione media o limitata (C)	Incidenza media
Il grado di conservazione dell'Habitat o della specie all'interno dell'area di influenza subisce un declassamento a seguito della realizzazione del progetto da Eccellente (A) a conservazione media o limitata (C) oppure Il grado di conservazione dell'Habitat o della specie all'interno dell'area di influenza è medio o limitato (C) e subisce un ulteriore peggioramento a seguito della realizzazione del progetto oppure L'habitat o la specie che subiscono il declassamento del grado di conservazione a seguito della realizzazione del progetto sono prioritari	Incidenza alta

Tabella 7: Criteri adottati per valutare il livello di significatività delle incidenze per ogni singolo Habitat o singola specie bersaglio

3.4.1 Descrizione del grado di conservazione allo status quo Habitat

Per valutare la variazione del grado di conservazione si rende necessario conoscere il grado di conservazione allo attuale e quello previsto. Per misurare il grado di conservazione verrà usato il metodo indicato dalla DGR 2299.

Come spiegato nei paragrafi precedenti gli interventi previsti ricadono nell'habitat di interesse comunitario 3260 ma il fattore di pressione individuato (inquinamento acustico) non comporta modifiche, del grado di conservazione.

Riguardo la fauna non ci sarà alcun disturbo significativo per le specie animali di interesse comunitario. Il cronoprogramma infatti prevede che, nei periodi riproduttivi delle specie, i lavori siano sospesi. I siti di nidificazione inoltre sono da escludersi nel tratto interessato dal progetto, per l'avifauna, in quanto ambienti non ottimali e prossimi ad aree antropizzate.

Anche per l'erpetofauna si escludono disturbi significativi negativi perchè, anche se nella fase di cantiere che è solo temporanea, possono essere coinvolti e disturbati alcuni individui, si tratta comunque di una parte del tutto esigua rispetto alla popolazione dell'area Natura 2000 considerando che le zone più vocate per queste specie interessano ambiti nel complesso molto più estesi.

Si riporta, nella tabella seguente, il prospetto della valutazione della significatività delle incidenze sulle singole specie bersaglio dell'attività in esame.

Nome scientifico	Effetti Diretti	Effetti Indiretti	Trend nell'area di influenza	Valutazione	Incidenza diretta	Incidenza indiretta
AVIFAUNA						
<i>Alcedo atthis</i>	-	Disturbo fauna	La specie risulta nidificante e presente nel SIC "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" tutto l'anno.	In fase di cantiere la specie potrà essere disturbata dal rumore generato dai mezzi operativi e dalla presenza di personale durante le attività di progetto ma le precauzioni progettuali, riferite ai periodi di riposo del cantiere nei periodi riproduttivi, possono limitare gli effetti. Si potrà verificare un momentaneo allontanamento della specie nei giorni di cantiere attivo e, al termine dei lavori, vi sarà un ritorno degli individui. Non si evidenziano pertanto effetti del progetto valutato che possano cambiare sfavorevolmente il grado di conservazione della specie. L'incidenza risulta pertanto non significativa	Nulla	Non significativa
ANFIBI E RETTILI						
<i>Pelophylax esculentus</i> <i>Podarcis muralis</i> <i>Lacerta bilineata</i> <i>Natrix natrix</i> <i>Natrix tessellata</i> <i>Hieropis viridiflavus</i>	-	Disturbo fauna	Le specie sono presenti nel sito.	Gli interventi di riqualificazione ambientale previsti dal progetto non interesseranno zone di riproduzione delle specie. In relazione alle precauzioni progettuali inoltre, riferite ai periodi di riposo del cantiere nei periodi riproduttivi, ed in particolare per quanto riguarda gli scavi ed i movimenti di terra, da effettuarsi in fase di cantiere tra febbraio e marzo, non si evidenziano effetti delle opere valutate che possano cambiare sfavorevolmente il grado di conservazione della stessa all'interno del sito. La fase di cantiere inoltre, che è solo temporanea, potrebbe coinvolgere solo pochi individui; si tratta comunque di una parte del tutto esigua rispetto alla popolazione dell'Area Natura 2000 considerando che le aree più vocate per queste specie interessano ambiti nel complesso molto più estesi. Si precisa inoltre che alcuni interventi di riqualificazione porteranno un miglioramento dell'ambiente di risorgiva favorendo la presenza e diventando potenziali habitat di specie per molti anfibi e rettili (realizzazione prato umido) con la prospettiva di modificarne il grado di conservazione in positivo. L'incidenza risulta pertanto non significativa.	Nulla	Non significativa

Tabella 8: Valutazione della significatività delle incidenze sulle specie bersaglio dei siti

FASE 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare

Vengono di seguito riportate le tabelle contenenti una sintesi delle informazioni raccolte durante la stesura di suddetta valutazione di incidenza.

Il quadro di sintesi contiene, in forma di tabella, il riepilogo delle informazioni contenute nella fase preliminare della relazione di incidenza.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento	
Titolo dell'intervento	TAVOLA 8 " Roggia Giosa"
Proponente - Committente	Comune di Bressanvido
Autorità procedente	Comune di Bressanvido
Autorità competente all'approvazione	Consorzio Bonifica Brenta
Professionisti incaricati dello studio	Dr.ssa For. Silvia Artolozzi
	Dr. biol. Stefano Salviati
Comuni interessati	Comune di Bressanvido
Descrizione sintetica dell'intervento	I progetti previsti dal LIFE14 NAT/IT/000938 prevedono interventi volti alla posa di deflettori, massi e sassi all'interno della roggia Giosa per migliorare il recupero della funzionalità dei servizi ecosistemici, nel territorio del Comune di Bressanvido.
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati	SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti	Non vi sono piani, progetti e/o interventi che possano interagire congiuntamente con il progetto oggetto di valutazione.

Valutazione della significatività degli effetti	
Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica	Sulla base delle considerazioni fatte si può affermare che l'incidenza dell'intervento sugli habitat di interesse comunitario saranno nulle in quanto non vi sarà perdita di superficie o frammentazione, nè alterazioni significative o danni delle sue componenti ecologiche principali data la natura e la tipologia degli interventi. In ogni caso qualsiasi tipo di impatto in fase di cantiere (ripristino e consolidamento della rete di risorgive) sarà reversibile e limitato nel tempo; gli interventi infatti, sono volti al ripristino e al consolidamento della infrastruttura verde dalla rete di risorgive, rogge, corsi d'acqua e relativi ambienti ripariali ed il recupero della funzionalità dei servizi ecosistemici e pertanto saranno migliorativi per il Sito. Riguardo la fauna non ci sarà alcun disturbo significativo per le specie animali di interesse comunitario. Il cronoprogramma prevede infatti che gli interventi verranno effettuati nei periodi in cui non vi di riproduzione delle specie. Gli interventi inoltre porteranno ad un aumento degli habitat di specie e pertanto favorevoli alla componente faunistica; il grado di conservazione delle stesse non subirà effetti negativi.

Consultazione con gli Organi e Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione	Sono state effettuate consultazioni con il Consorzio di Bonifica Brenta, Veneto Agricoltura, Comune di Bressanvido e Comitato Risorgive di Bressanvido.
--	---

Dati raccolti per l'elaborazione - Bibliografia			
Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Responsabili della verifica	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati
Carta Ittica Provincia di Vicenza	Buono	Dr. Stefano Salviati Dr. Silvia Artolozzi	Aquaprogram srl
Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto. Regione del Veneto	Buono	Dr. Stefano Salviati Dr. Silvia Artolozzi	www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/manuali-e-guide
Calendario riproduttivo dell'avifauna nella Regione Veneto - Associazione Faunisti Veneti.	Buono	Dr. Stefano Salviati Dr. Silvia Artolozzi	http://www.faunistiveneti.it/publicazioni
Atlante degli anfibi del Veneto	Buono	Dr. Stefano Salviati Dr. Silvia Artolozzi	Aquaprogram srl
Atlante degli Uccelli Nidificanti della Provincia di Vicenza	Buono	Dr. Stefano Salviati Dr. Silvia Artolozzi	Aquaprogram srl

SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"					
Habitat/specie		Presenza nell'area oggetto di valutazione (**)	Significatività negativa delle incidenze dirette(*)	Significatività negativa delle incidenze indirette(*)	Presenza di effetti sinergici e cumulativi (**)
Cod	Nome				
Habitat					
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitrichon-Batrachion</i>	Si	Nulla	Nulla	No
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	No	Nulla	Nulla	No
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	No	Nulla	Nulla	No
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)"	No	Nulla	Nulla	No
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	No	Nulla	Nulla	No
Uccelli					
<i>Pernis apivorus</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Egretta garzetta</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Alcedo atthis</i>		Si	Nulla	Non significativa	No
<i>Milvus migrans</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Nycticorax nycticorax</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Falco columbarius</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Circus pygargus</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Circus aeruginosus</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Philomachus pugnax</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Pluvialis apricaria</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Circus cyaneus</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Pandion haliaetus</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Tringa glareola</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Luscinia svecica</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Asio otus</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Otus scops</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Rallus aquaticus</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Scolopax rusticola</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Tyto alba</i>		No	Nulla	Nulla	No
Erpetofauna					
<i>Rana latastei</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Pelophylax esculentus</i>		Si	Nulla	Non significativa	No
<i>Hyla intermedia</i>		No	Nulla	Nulla	No
<i>Rana dalmatina</i>		No	Nulla	Nulla	No

<i>Podarcis muralis</i>	Sì	Nulla	Non significativa	No
<i>Lacerta bilineata</i>	Sì	Nulla	Non significativa	No
<i>Natrix natrix</i>	Sì	Nulla	Non significativa	No
<i>Natrix tessellata</i>	Sì	Nulla	Non significativa	No
<i>Hieropis viridiflavus</i>	Sì	Nulla	Non significativa	No
Pesci				
<i>Cottus gobio</i>	No	Nulla	Nulla	No
<i>Telestes muticellus</i>	No	Nulla	Nulla	No
<i>Protochondrostoma genei</i>	No	Nulla	Nulla	No
<i>Barbus plebejus</i>	No	Nulla	Nulla	No
<i>Cobitis taenia</i>	No	Nulla	Nulla	No

Dichiarazione firmata del professionista

La descrizione dell'intervento "TAVOLA 8 " Roggia Girona" riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

Con ragionevole certezza scientifica, relativamente all'intervento esaminato ed alle informazioni elaborate in fase di Screening, si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui Siti Rete Natura 2000 SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe".

Vicenza 01/06/2016

Dr. Silvia Artolozzi

Firma e timbro



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Silvia Artolozzi". To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text: "Dott. ARTOLOZZI SILVIA n. 343" in the center, "ALBO" at the bottom, and "ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROV. DI VICENZA" around the perimeter.

Dr. Stefano Salviati

Firma e timbro



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Stefano Salviati". To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text: "ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI" around the top perimeter, "STEFANO SALVIATI" in the center, "ALBO PROFESSIONALE" at the bottom, and the number "29300" in the middle.

BIBLIOGRAFIA E FONTI

- AA. VV. 2004. Censimento delle aree naturali "minori" della Regione Veneto. Regione del Veneto. Arpav. 37 pp. + cd-rom
- BON M., DE BATTISTI R., MEZZAVILLA F., PAOLUCCI P. & VERNIER E. (curatori), 1996. Atlante dei Mammiferi del Veneto (1970-1995). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., Venezia.
- BONATO L., FRACASSO G., POLLO R., RICHARD J., SEMENZATO M. (eds.), 2007. Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto,. Associazione Faunisti Veneti, Nuovadimensione Ed.;
- BUFFA G., LASSEN C., 2010. Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto. Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi. Venezia.
- Comunità Europea, 2000, “La gestione dei siti Natura 2000. Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE”.
- Comunità Europea, 2002, “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”.
- Giancarlo Fracasso, Mauro Bon, Francesco Scarton, Francesco Mezzavilla (a cura di) - 2011 Calendario riproduttivo dell'avifauna nella Regione Veneto - Associazione Faunisti Veneti.
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Teritorio, “Manuale di gestione dei siti Natura 2000”.
-
- Rete Ecologica Nazionale <http://www.gisbau.uniroma1.it/ren.php>
- Habitat Italia <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do>
- Regione Veneto <http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/>

ALLEGATI

Allegato 1: TAVOLA 8 "Roggia Girosa" - Tavola di progetto

Allegato 2: TAVOLA 8 " Roggia Girosa " - Piano Particellare

MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

La sottoscritta Silvia Artolozzi, incaricata da Aquaprogram srl, di elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente l'intervento, come disciplinati dal D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio.

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l'amministrazione regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941.

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte.

Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

Luogo e data

01/06/2016

Firma per esteso per accettazione

Silvia Artolozzi



Silvia Artolozzi

MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il sottoscritto Stefano Salviati, incaricato dal Comune di Bressanvido, proponente l'intervento, di elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente l'intervento, come disciplinati dal D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio.

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l'amministrazione regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941.

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte.

Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

Luogo e data

01/06/2016

Firma per esteso per accettazione

Stefano Salviati



PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

La sottoscritta Silvia Artolozzi nata a Arzignano prov. VI il 03/07/1978 e residente in Via Tarvisio n. 5 nel Comune di Vicenza prov. VI CAP 36100 tel. 347/4224934 email s.artolozzi@epap.conafpec.it in qualità di estensore della VincA della domanda di autorizzazione per lo "TAVOLA 8 " Roggia Girosa"

DICHIARA

(barrare e compilare quanto di pertinenza)

di appartenere all'ordine professionale dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Vicenza con il n. 343 dal 21/01/2009;

di essere in possesso del titolo di studio di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali rilasciato dalla Facoltà di Agraria - Università degli Studi di Padova nell'A.A. 2004/2005;

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualifica tecnica Corso di Alta Formazione VAS VincA (2015) Regione Veneto.

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

DATA

01/06/2016

II DICHIARANTE

Silvia Artolozzi



Silvia Artolozzi

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA

01/06/2016

II DICHIARANTE

Silvia Artolozzi



Silvia Artolozzi

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Stefano Salviati nato a Vicenza prov. Vi il 17 novembre 1960 e residente in Via Sauro 3 nel Comune di Vicenza prov. VI CAP 36100 tel. 0444 301212 email s.salviati@aquaprogram.it in qualità di estensore della VincA della domanda di autorizzazione per la "TAVOLA 8 " Roggia Giorosa"

DICHIARA

(barrare e compilare quanto di pertinenza)

di appartenere all'ordine nazionale dei Biologi al numero 29300;

di essere in possesso del titolo di studio di Laurea in Scienze Biologiche;

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualifica tecnica Corso di Alta Formazione VAS VincA (2015) Regione Veneto.

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

DATA

01/06/2016

IL DICHIARANTE

Stefano Salviati



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.


DATA

01/06/2016

II DICHIARANTE

Stefano Salviati






Cognome	ARTOLOZZI
Nome	SILVIA
nato il	03/07/1978
(atto n.	395 P. I S A)
a.	ARZIGNANO (VI)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	VICENZA
Via	VIALE ASTICHELLO 168
Stato civile	STATO LIBERO
Professione	-----
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	168
Capelli	CASTANO SCURO
Occhi	VERDI
Segni particolari	

	
Firma del titolare <i>Silvia Artolozzi</i>	
Venezia, 26/04/2012	
Impronta del dito Indice sinistro	IL SINDACO D'ORDINE DEL SINDACO Germana Cargagnolo Istruttrice Delegata
	



Cognome	SALVIATI
Nome	STEFANO
nato il	17/11/1960
(atto n.	2801 P. I S A)
a	VICENZA ()
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	VICENZA
Via	VIA SAURO N. 3
Stato civile	CONIUGATO
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	178
Capelli	CASTANO CHIARO
Occhi	VERDI
Segni particolari	

	
Firma del titolare. <i>Stefano Salviati</i>	
Vicenza, 20/08/2008	
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO D'ORDINE DEL SINDACO Germana Campagnolo Istruttore Delegato <i>Germana Campagnolo</i>
	